

OUEST : bords d'une doline, sur le plateau d'Ankara (Boina) vers 300 m. d'alt., *Perrier* 1093.

8. *Ammania quadriciliata* spec. nov.

Hygrophila, glabra, biennis (?), ex rhizomate repenti ramosa; rami 4-6, 7-10 cm. longi, eleganter erecto-recurvi, dense foliosi. Folia decussata vulgo reflexa, lanceolata (5-10 × 1-3 mm) basi truncato-auriculata, ex basi apicem, versus acute-attenuata, omnia florifera. Flores 4-meri axillares, sessiles, bibracteolati, semper solitarii. Receptaculum obconicum haud costatum : appendiculae 4, minusculae, dentiformes, pilounico longo (5 mm) terminatae; calycis lobi triangulares : petala 4, minutissima : stamina 2; capsula sphaerica irregulariter rumpens.

OUEST : près d'une source d'eau vive, sur calcaire, env. de Maroadabo (Boina), connu de cette seule localité, *Perrier* 6613.

NOTE SUR « **CLEMATIS PSEUDOSCABIOSAEFOLIA** » NOM. NOV.
DE MADAGASCAR

Par H. PERRIER DE LA BATHIE

Nous avons décrit en 1949 et 1950 sous le nom erroné de *C. scabiosae-folia* D. C., espèce dont nous n'avions vu qu'un spécimen très incomplet, un *Clematis* du centre de Madagascar. M. le Dr J. LÉONARD a eu l'extrême bienveillance de nous prévenir de cette erreur et de nous demander, pour faire disparaître toute confusion à ce sujet, de donner un nom nouveau à l'espèce de Madagascar, qui est en effet très différente du vrai *C. scabiosae-folia* d'Afrique tropicale. Cette rectification, que la courtoisie du Docteur J. LÉONARD nous permet de faire, et une description de cette nouvelle espèce, seront donc l'objet de cette courte note.

***Clematis pseudoscabiosae-folia* nom. nov.** — *C. scabiosae-folia* Vig. et Perr. (non D.C.) in *Mém. Inst. Sc. Mad.*, II, fasc. 1-2 (1949), 223 et in *Humbert Fl. Madag. et Com.*, Renonculacées (1950), 20, t. VI.

Fa. *normalis* ignota.

Fa. *pyromorpha*.

Omnino albido-velutina; folia caulina breviter petiolata v. subsessilia, circuitu subduplo latiora quam longiora; foliola 3, raro 5, sessilia subsessiliave, basi cuneata, trifida v. trisepta, segmentis saepe trifidis v. inciso-dentatis, pagina superiore sparsim pilosa, pilis longis saepe bi v. ternis. Flores terminales 1-5; alabastrum globosum apiculatum. Achaenia pilis fuscatis brevibus dense vestita.

Lieux dénudés sur quartzites ou cipolins, entre 1500 et 2000 m. d'alt.

CENTRE : Ambatofangena à l'Ouest d'Ambositra, *Perrier* 4915, type! ; Baron sans no ni localité.